

## Návod na použitie

### Aspecton® Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli Lišajník islandský

Pre deti vo veku od 1 roka

#### **Milá používateľka, milý používateľ,**

pozorne si prečítajte, prosím, celý návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie o tom, na čo máte dbať pri používaní tejto zdravotníckej pomôcky. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

#### **Čo Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli obsahuje?**

100 ml sirupu obsahuje 11,12 g tekutého výťažku z lišajníka islandského (*Lichen islandicus*) (1:1).

#### Dalšie zložky:

Sorban draselný (E202), roztok maltitolu (E965), kyselina citrónová bezvodá (E330), hydroxyetylcelulóza, makrogolglycerolhydroxystearát, propylénglykol (E1520), sukralóza (E955), medová aróma, čistená voda.

Neobsahuje alkohol a cukor. Neobsahuje lepok a laktózu.

#### **Kedy sa používa Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli?**

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli je sirup, ktorý sa používa pri podráždení slizníc ústnej dutiny a hrdla a s tým súvisiacim suchým a dráždivým kašľom.

Zložky lišajníka islandského (*Lichen islandicus*) vytvárajú ochrannú vrstvu na slizniciach ústnej dutiny a hrdla. Podráždené sliznice sú tak chránené pred vonkajším napadnutím, čím sa zabráni vzniku kašľa.

Utišujúce pôsobenie sa dosahuje vysokým podielom slizovitých látok vo výťažku lišajníka islandského. Tieto látky zabráňujú vysušovaniu slizníc viazaním vody na ich povrchu.

#### **Buďte opatrný pri používaní Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli**

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli sa nesmie používať pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zo zložiek.

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli nie je vhodný pre deti do 1 roka.

Táto zdravotnícka pomôcka obsahuje roztok maltitolu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky.

10 ml obsahuje 3,43 g maltitolu, čo zodpovedá približne 0,29 chlebových jednotiek. Ak musíte dodržiavať diabetickú diétu, vezmite to do úvahy. Kalorická hodnota roztoku maltitolu je 2,3 kcal/g. Maltitol môže mať mierny laxatívny účinok.

Makrogolglycerolhydroxystearát môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku.


O použití tejto zdravotníckej pomôcky počas tehotenstva a dojčenia nie sú k dispozícii žiadne postačujúce štúdie. Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli sa preto má počas tehotenstva a dojčenia používať iba po konzultácii s lekárom.

### **Ako sa používa Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli**

Deti vo veku 1-4 roky užívajú 5 ml 1-2-krát denne, deti vo veku 5-10 rokov užívajú 10 ml dvakrát denne a deti a dospelí vo veku 11-16 rokov užívajú 10 ml 3-4-krát denne.

Balenie obsahuje dávkovaciu striekačku pre presné dávkovanie.

Pokyny na použitie dávkovacej striekačky:



1. Vložte dávkovaciu striekačku do otvorenej fľašky a zatlačte ju smerom dole, kým pevne nezapadne. Piest striekačky musí byť pritom zasunutý v striekačke nadoraz.
2. Otočte fľašku opatrne dnom hore a pomocou dávkovacej striekačky pomaly naberte sirup tak, že piest vytiahnete na požadovanú značku.
3. Znovu otočte fľašku a opatrným otáčaním vytiahnite striekačku z hrdla fľašky. Fľašku znovu zatvorte.
4. Užite sirup tak, že striekačku pomaly vyprázdnete proti vnútornej stene líca, alebo ho užite pomocou lyžičky.
5. Po použití vytiahnite piest zo striekačky, jednotlivé časti umyte teplou vodou a striekačku vysušte.

#### Upozornenie pre diabetikov:

10 ml zodpovedá 0,29 BU (chlebových jednotiek/výmenných sacharidových jednotiek).

Nejedzte a nepite priamo po užití Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli, pretože to odstráni ochrannú vrstvu na slizniciach ústnej dutiny a hrdla.

### **Ako dlho smiete používať Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli?**

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni bez zlepšenia, musíte sa obrátiť na lekára.

### **Aké pokyny ohľadne času použiteľnosti a uchovávania sa musia dodržiavať??**

Dátum expirácie neotvorenej fľašky je vytlačený na škatuľke a štítku. Po tomto dátume už toto balenie nepoužívajte.

Po prvom otvorení fľašky zdravotnícku pomôcku spotrebujte do 6 mesiacov.

Uchovávajúte pri teplote do 25 °C.

**V akých veľkostiach balenia je Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli k dispozícii?**

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli je k dispozícii vo fľaškách obsahujúcich 100 ml sirupu.

Ku každému baleniu je priložená dávkovacia striekačka (CE označenie zdravotníckej pomôcky 0120).

**Výrobca**

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstr. 2, 53783 Eitorf, Nemecko  
Tel.: +49 (0)2243 / 87-0, fax: +49 (0)2243 / 87-175  
e-mail: info@krewelmeuselbach.de

**Dátum revízie textu:**

Marec 2016

[CE označenie]

**Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.**